

院内登録レジメン一覧

[血液がん]

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
11192	2011.12.6	(研)Vinblastine(6) 悪性リンパ腫	ビンブラスチン(VLB)	エクザール注射用	6mg/m ² (max 10mg)	点滴静注 day 1	7日	小児未分化大細胞型リンパ腫	済
12212	2012.10.2	(研)[AML-05]寛解導入療法1:ECM	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	150mg/m ²	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	200mg/m ²	点滴静注 day 6-12			
			ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 6-10			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 6			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 6			
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 6			
		(研)[AML-05]寛解導入療法2:HCEI	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	3000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-3	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
			イダルビシン(IDR)	イダマイシン静注用	10mg/m ²	点滴静注 day 1			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 1			
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 1			
		(研)[AML-05]低リスク群 強化療法1:HCE	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 1			
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 1			
		(研)[AML-05]低リスク群 強化療法2:HCl	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	3000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-3	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			イダルビシン(IDR)	イダマイシン静注用	10mg/m ²	点滴静注 day 1-3			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 1			
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 1			
		(研)[AML-05]低リスク群 強化療法3:HC	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 1			
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 1			
		(研)[AML-05]中間リスク群 強化療法1及び3:HCM	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 1-3			
メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート		3mg-12mg	髄注 day 1					
シタラビン(Ara-C)	キロサイド注		6mg- 30mg	髄注 day 1					
ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用		10mg-25mg	髄注 day 1					
(研)[AML-05]中間リスク群 強化療法2:HCEI	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	3000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-3	28日	小児急性骨髄性白血病	済		
	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5					
	イダルビシン(IDR)	イダマイシン静注用	10mg/m ²	点滴静注 day 1					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 1					
	ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 1					
(研)[AML-05]中間リスク群 強化療法3:HC	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済		
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 1					
	ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 1					
(研)[AML-05]高リスク群 強化療法1:HCM	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² /回 × 1日2回	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済		
	ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 1-3					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3mg-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6mg- 30mg	髄注 day 1					
	ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10mg-25mg	髄注 day 1					
13228	2013.4.2	(研)[ALL SR-02]VCR(1.5)+MTX+6-MP+PSL 維持療法(3歳以上)	ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.3mg/m ²	静脈内注射 day 1	7日	急性リンパ性白血病	済
			メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	25mg/m ²	経口投与 day 1			
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 1-7			
			ブレドニゾロン(PSL)	ブレドニン錠	40mg/m ²	経口投与 day 1-7			

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無					
13228	2013.4.2	(研)[ALL SR-02]MTX+Ara-C+HDC+MTX+6-MP 維持療法(3歳以上)	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	12mg	髄注 day 1	7日	急性リンパ性白血病	済					
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	30mg	髄注 day 1								
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	25mg	髄注 day 1								
			メトトレキサート(MTX)	メソトレキサート錠	25mg/㎡	経口投与 day 1								
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-7								
		(研)[ALL SR-02]MTX+6-MP内服 維持療法(3歳以上)	メトトレキサート(MTX)	メソトレキサート錠	25mg/㎡	経口投与 day 1	7日	急性リンパ性白血病	済					
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-7								
13234	2013.6.4	(研)[ALL-B12]先行治療相	ブレドニゾン(PSL)	ブレドニン錠 水溶性ブレドニン	15-60mg/㎡	経口or静注 day 1-7	7日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 1								
		(研)[ALL-B12]寛解導入療法	ブレドニゾン(PSL)	ブレドニン錠 水溶性ブレドニン	7.5-60mg/㎡	経口or静注 day 1-29	29日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
			ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/㎡	静脈内注射 day 1, 8, 15, 22								
			ダウノルビシン(DNR)	ダウノマイシン静注用	30mg/㎡	点滴静注 day 1, 8								
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	5000U/㎡	筋肉内注射or点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26								
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)								
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)								
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)								
		(研)[ALL-B12]早期強化療法IB	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1000mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27								
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/㎡	経口投与 day 1-28								
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 10, 24								
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 10, 24								
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 10, 24								
		(研)[ALL-B12]早期強化療法IB+L	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1000mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27								
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/㎡	経口投与 day 1-28								
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 10, 24								
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 10, 24								
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 10, 24								
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	5000U/㎡	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27								
		(研)[ALL-B12]早期強化療法IB+VL	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1000mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27								
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/㎡	経口投与 day 1-28								
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 10, 24								
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 10, 24								
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 10, 24								
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	5000U/㎡	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27								
			ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/㎡ (max 2.0mg)	静脈内注射 day 15, 22								
		(研)[ALL-B12]強化療法M	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	2000mg/㎡	点滴静注 day 8	14日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	25mg/㎡	経口投与 day 1-14								
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 8								
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 8								
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 8								
		(研)[ALL-B12]強化療法M5	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/㎡	点滴静注 day 8	14日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	25mg/㎡	経口投与 day 1-14								
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 8								
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 8								
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 8								
		(研)[ALL-B12]強化療法M5+L	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/㎡	点滴静注 day 8	14日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-					
6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散		25mg/㎡	経口投与 day 1-14										
メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート		8-12mg	髄注 day 8										
シタラビン(Ara-C)	キロサイド注		20-30mg	髄注 day 8										
ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン		6-10mg	髄注 day 8										
L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用		12500U/㎡	筋肉内注射 day 10										

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13234	2013.6.4	(研)【ALL-B12】強化療法M5+VL	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/m ²	点滴静注 day 8	14日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	25mg/m ²	経口投与 day 1-14			
			ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 8			
			L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	12500U/m ²	筋肉内注射 day 10			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 8			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 8			
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 8			
		(研)【ALL-B12】強化療法HR3	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 デキサート注射液	20mg/m ²	経口or静注 day 1-5	21日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ²	点滴静注 day 1-2			
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 3-5			
			L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 5			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 5			
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 5			
		(研)【ALL-B12】強化療法HR2	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 デキサート注射液	20mg/m ²	経口or静注 day 1-5	21日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			ビンデシン(VDS)	注射用フィルデシン	3mg/m ² (max 5.0mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/m ²	点滴静注 day 1			
			イホスファミド(IFM)	注射用イホマイド	800mg/m ²	点滴静注 day 2-4			
			ダウノルビン(DNR)	ダウノマイシン静注用	30mg/m ²	点滴静注 day 5			
			L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 1 (day 5)			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 1 (day 5)			
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 1 (day 5)			
		(研)【ALL-B12】強化療法HR1	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 デキサート注射液	20mg/m ²	経口or静注 day 1-5	21日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/m ²	点滴静注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ²	点滴静注 day 5			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	200mg/m ²	点滴静注 day 2-4			
L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用		25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11					
メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート		8-12mg	髄注 day 1					
シタラビン(Ara-C)	キロサイド注		20-30mg	髄注 day 1					
ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン		6-10mg	髄注 day 1					
(研)【ALL-B12】再寛解導入療法III	ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 8	35日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-		
	デキサメタゾン(DEX) (10歳未満)	デカドロン錠 (デキサート注射液)	1.25-10mg/m ²	経口 (or静注) day 1-23					
	デキサメタゾン(DEX) (10歳以上)	デカドロン錠 (デキサート注射液)	10mg/m ²	経口 (or静注) day 1-7, 15-21					
	ビラルビン(THP)	テラルビン注射用	25mg/m ²	点滴静注 day 1, 8					
	L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	10000U/m ²	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11					
	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	500mg/m ²	点滴静注 day 15					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/m ²	静脈内注射 day 17-20, 24-27					
	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ²	経口投与 day 15-28					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 17, 24 (day 1)					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 17, 24 (day 1)					
	ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 17, 24 (day 1)					
(研)【ALL-B12】再寛解導入療法III+L	ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 8	35日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-		
	デキサメタゾン(DEX) (10歳未満)	デカドロン錠 (デキサート注射液)	1.25-10mg/m ²	経口 (or静注) day 1-23					
	デキサメタゾン(DEX) (10歳以上)	デカドロン錠 (デキサート注射液)	10mg/m ²	経口 (or静注) day 1-7, 15-21					
	ビラルビン(THP)	テラルビン注射用	25mg/m ²	点滴静注 day 1, 8					
	L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	10000U/m ²	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25					
	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	500mg/m ²	点滴静注 day 15					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/m ²	静脈内注射 day 17-20, 24-27					
	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ²	経口投与 day 15-28					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	8-12mg	髄注 day 17, 24 (day 1)					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 17, 24 (day 1)					
	ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	6-10mg	髄注 day 17, 24 (day 1)					

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13234	2013.6.4	(研)【ALL-B12】再寛解導入療法III+VL	ピンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 8, 15, 22	35日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			デキサメタゾン(DEX) (10歳未満)	デカドロン錠 (デキサート注射液)	1.25-10mg/m ²	経口 (or 静注) day 1-23			
			デキサメタゾン(DEX) (10歳以上)	デカドロン錠 (デキサート注射液)	10mg/m ²	経口 (or 静注) day 1-7, 15-21			
			ピラルビシン(THP)	テラルビシン注射用	25mg/m ²	点滴静注 day 1, 8			
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	10000U/m ²	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	500mg/m ²	点滴静注 day 15			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/m ²	静脈内注射 day 17-20, 24-27			
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ²	経口投与 day 15-28			
			メトレキサート(MTX)	注射用メトレキサート	8-12mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	20-30mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	6-10mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			(研)【ALL-B12】中間維持療法IM	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²			
		メトレキサート(MTX)	メトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1				
		(研)【ALL-B12】中間維持療法IM+VD	メトレキサート(MTX)	メトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22	28日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 1-28			
			ピンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1			
		(研)【ALL-B12】維持療法	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 デキサート注射液	6mg/m ²	経口 or 静注 day 1-5	7日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			メトレキサート(MTX)	メトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1			
		(研)【ALL-B12】維持療法+VD	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 1-7	28日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	-
			メトレキサート(MTX)	メトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22			
6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散		50mg/m ²	経口投与 day 1-28					
ピンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用		1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1					
(研)【ALL-T11】先行治療相	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 デキサート注射液	6mg/m ²	経口 or 静注 day 1-5	7日	T細胞性急性リンパ性白血病	-		
	プレドニゾン(PSL)	プレドニン錠 水溶性プレドニン	15-60mg/m ²	経口 or 静注 day 1-7					
	メトレキサート(MTX)	注射用メトレキサート	6-12mg	髄注 day 1					
	メトレキサート(MTX)	メトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22					
(研)【ALL-T11】寛解導入療法IA	2013.6.4	(研)【ALL-T11】寛解導入療法IA	ピンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 8, 15, 22	35日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			デキサメタゾン(DEX) (10歳未満)	デカドロン錠	1.25-10mg/m ²	経口 day 1-30			
			デキサメタゾン(DEX) (10歳以上)	デカドロン錠	1.25-10mg/m ²	経口 day 1-7, 15-30			
			ダウノルビシン(DNR)	ダウノマイシン静注用	30mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15, 22			
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	5000U/m ²	筋肉内注射 or 点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26			
			メトレキサート(MTX)	注射用メトレキサート	6-12mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
			プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1000mg/m ²	点滴静注 day 1, 29			
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	5000U/m ²	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27			
(研)【ALL-T11】早期強化療法IB	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/m ²	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27	42日	T細胞性急性リンパ性白血病	-		
	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ²	経口投与 day 1-28					
	メトレキサート(MTX)	注射用メトレキサート	6-12mg	髄注 day 10, 24					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 10, 24					
	プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 10, 24					
(研)【ALL-T11】SRの強化療法M+L	メトレキサート(MTX)	注射用メトレキサート メトレキサート点滴静注液	5000mg/m ²	点滴静注 day 8, 22, 36, 50	70日	T細胞性急性リンパ性白血病	-		
	L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	12500U/m ²	筋肉内注射 day 10, 24, 38, 52					
	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	25mg/m ²	経口投与 day 1-56					
	メトレキサート(MTX)	注射用メトレキサート	6-12mg	髄注 day 8, 22, 36, 50					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 8, 22, 36, 50					
(研)【ALL-T11】SRの再寛解導入療法IIA+L	プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 8, 22, 36, 50	35日	T細胞性急性リンパ性白血病	-		
	ピンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 8, 15, 22, 29					
	デキサメタゾン(DEX) (10歳未満)	デカドロン錠	1.25-10mg/m ²	経口 day 1-30					
	デキサメタゾン(DEX) (10歳以上)	デカドロン錠	1.25-10mg/m ²	経口 day 1-7, 15-30					
	ドキシソルビシン(DXR)	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	点滴静注 day 8, 15, 22, 29					
	L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	10000U/m ²	筋肉内注射 day 8, 11, 15, 18					
	メトレキサート(MTX)	注射用メトレキサート	6-12mg	髄注 (day 1, 18)					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 (day 1, 18)					
プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 (day 1, 18)						

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13235	2013.6.4	(研)【ALL-T11】SRの再寛解導入療法IIB+L	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1000mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/m ²	静脈内注射 day 3-6, 10-13			
			L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	10000U/m ²	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11			
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ²	経口投与 day 1-14			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 3, 10			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 3, 10			
			ブレドニゾロン(PSL)	水溶性ブレドニン	4-10mg	髄注 day 3, 10			
		(研)【ALL-T11】SRの維持療法	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 1-56			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 1			
		(研)【ALL-T11】HRの強化療法NEL	ネララビン(NEL)	アラノジール静注用	650mg/m ²	点滴静注 day 1-5	7日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
		(研)【ALL-T11】HRの強化療法HR3	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠	20mg/m ²	経口投与 day 1-5	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ²	点滴静注 day 1, 2			
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 3-5			
			L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 5			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 5			
			ブレドニゾロン(PSL)	水溶性ブレドニン	4-10mg	髄注 day 5			
		(研)【ALL-T11】HRの強化療法HR2	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠	20mg/m ²	経口投与 day 1-5	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			ビンデシン(VDS)	注射用フィルデシン	3mg/m ² (max 5.0mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg	点滴静注 day 1			
			イホスファミド(IFM)	注射用イホマイド	800mg/m ²	点滴静注 day 2-4			
			ダウノルビシン(DNR)	ダウノマイシン静注用	30mg/m ²	点滴静注 day 5			
			L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1 (day 5)			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 1 (day 5)			
			ブレドニゾロン(PSL)	水溶性ブレドニン	4-10mg	髄注 day 1 (day 5)			
(研)【ALL-T11】HRの強化療法HR1	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠	20mg/m ²	経口投与 day 1-5	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-		
	ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 6					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg	点滴静注 day 1					
	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	200mg/m ²	点滴静注 day 2-4					
	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ²	点滴静注 day 5					
	L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 1					
	ブレドニゾロン(PSL)	水溶性ブレドニン	4-10mg	髄注 day 1					
(研)【ALL-T11】HRの再寛解導入療法IIA+L	ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 8, 15, 22, 29	35日	T細胞性急性リンパ性白血病	-		
	デキサメタゾン(DEX) (10歳未満)	デカドロン錠	1.25-10mg/m ²	経口 day 1-30					
	デキサメタゾン(DEX) (10歳以上)	デカドロン錠	1.25-10mg/m ²	経口 day 1-7, 15-30					
	ドキシソルピシン(DXR)	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	点滴静注 day 8, 15, 22, 29					
	L-アスバラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	10000U/m ²	筋肉内注射 day 8, 11, 15, 18					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 (day 1, 18)					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 (day 1, 18)					
	ブレドニゾロン(PSL)	水溶性ブレドニン	4-10mg	髄注 (day 1, 18)					
	(研)【ALL-T11】HRの再寛解導入療法IIB+L	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1000mg/m ²				点滴静注 day 1	35日
L-アスバラギナーゼ(L-ASP)		ロイナーゼ注用	10000U/m ²	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11					
シタラビン(Ara-C)		キロサイド注	75mg/m ²	静脈内注射 day 3-6, 10-13					
6-メルカプトプリン(6-MP)		ロイケリン散	60mg/m ²	経口投与 day 1-14					
メトトレキサート(MTX)		注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 3, 10					
シタラビン(Ara-C)		キロサイド注	16-30mg	髄注 day 3, 10					
ブレドニゾロン(PSL)		水溶性ブレドニン	4-10mg	髄注 day 3, 10					

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13235	2013.6.4	(研)[ALL-T11]HRの維持療法CNS3以外の場合①	ネララビン(NEL)	アラノンジ-静注用	650mg/m ²	点滴静注 day 1-5	56日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50			
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 8-56			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 29			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 29			
			プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 29			
		(研)[ALL-T11]HRの維持療法CNS3以外の場合②	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 1-56			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 29			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 29			
			プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 29			
		(研)[ALL-T11]HRの維持療法CNS3の場合サイクル1	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 1-56			
		(研)[ALL-T11]HRの維持療法CNS3の場合サイクル2以降①	ネララビン(NEL)	アラノンジ-静注用	650mg/m ²	点滴静注 day 1-5	56日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50			
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 8-56			
		(研)[ALL-T11]HRの維持療法CNS3の場合サイクル2以降②	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ²	経口投与 day 1-56			
		(研)[ALL-T11]VHRの寛解後治療NEL	ネララビン(NEL)	アラノンジ-静注用	650mg/m ²	点滴静注 day 1-5	7日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
		(研)[ALL-T11]VHRの寛解後治療HR3	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠	20mg/m ²	経口投与 day 1-5	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ²	点滴静注 day 1, 2			
エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液		100mg/m ²	点滴静注 day 3-5					
L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用		25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11					
メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート		6-12mg	髄注 day 5					
シタラビン(Ara-C)	キロサイド注		16-30mg	髄注 day 5					
プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン		4-10mg	髄注 day 5					
(研)[ALL-T11]VHRの寛解後治療HR2	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠	20mg/m ²	経口投与 day 1-5	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-		
	ビンデシン(VDS)	注射用フィルデシン	3mg/m ² (max 5.0mg)	静脈内注射 day 1, 6					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg	点滴静注 day 1					
	イホスファミド(IFM)	注射用イホマイド	800mg/m ²	点滴静注 day 2-4					
	ダウノルビシン(DNR)	ダウノマイシン静注用	30mg/m ²	点滴静注 day 5					
	L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1 (day 5)					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 1 (day 5)					
	プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 1 (day 5)					
	(研)[ALL-T11]VHRの寛解後治療HR1	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠	20mg/m ²				経口投与 day 1-5	21日
ピンクリステン(VGR)		オンコピン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 6					
メトトレキサート(MTX)		注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg	点滴静注 day 1					
シクロホスファミド(CPA)		注射用エンドキサン	200mg/m ²	点滴静注 day 2-4					
シタラビン(Ara-C)		シタラビン点滴静注液	2000mg/m ²	点滴静注 day 5					
L-アスパラギナーゼ(L-ASP)		ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 6, 11					
メトトレキサート(MTX)		注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1					
シタラビン(Ara-C)		キロサイド注	16-30mg	髄注 day 1					
プレドニゾン(PSL)		水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 1					
(研)[ALL-T11]VHRの寛解後治療Con.C		デキサメタゾン(DEX)	デキサート注射液	82.5mg/m ²	点滴静注 day 1, 3, 5	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-	
	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	300mg/m ²	点滴静注 day 1-5					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 1					
	プレドニゾン(PSL)	水溶性プレドニン	4-10mg	髄注 day 1					

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13235	2013.6.4	(研)【ALL-T11】VHRの寛解後治療Con.A	ブレドニゾン(PSL)	ブレドニン錠 水溶性ブレドニン	40mg/m ²	経口or静注 day 1-7	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg	点滴静注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	300mg/m ²	点滴静注 day 2-6			
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 3, 8			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	16-30mg	髄注 day 1			
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	4-10mg	髄注 day 1			
		(研)【ALL-T11】VHRの寛解後治療Con.B	ブレドニゾン(PSL)	ブレドニン錠 水溶性ブレドニン	40mg/m ²	経口or静注 day 1-7	21日	T細胞性急性リンパ性白血病	-
			ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2.0mg)	静脈内注射 day 1, 8			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1200mg/m ²	点滴静注 day 1			
			ピラルビン(THP)	テラルビシン注射用	25mg/m ²	点滴静注 day 2, 3			
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	25000U/m ²	筋肉内注射 day 3, 10, 17			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	6-12mg	髄注 day 1			
シタラビン(Ara-C)	キロサイド注		16-30mg	髄注 day 1					
ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン		4-10mg	髄注 day 1					
13256	2013.12.3	(研)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コースP	ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	10mg/m ²	点滴静注 day 1-3	7日	小児成熟B細胞性腫瘍	済
			ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	20mg/m ²	点滴静注 day 4-7			
			ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1mg/m ²	静脈内注射 day 3			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	150mg/m ²	点滴静注 day4-6			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3ヶ月未満・・・3mg 1歳未満・・・6mg 1歳・・・8mg 2歳・・・10mg 3歳以上・・・12mg	髄注 day 1			
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満・・・10mg 1歳未満・・・10mg 1歳・・・15mg 2歳・・・20mg 3歳以上・・・25mg	髄注 day 1			
		(研)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース4A1	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 (デキサート注)	10mg/m ² (8.25mg/m ²)	経口投与 day 1-8 (経口不可の場合点滴静注 day1-8)	21日	小児成熟B細胞性腫瘍	済
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/m ²	点滴静注 day 1			
			ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 2			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	250mg/m ²	点滴静注 day 2-4			
			ピラルビン(THP)	テラルビシン注射用	30mg/m ²	点滴静注 day 3, 4			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3ヶ月未満・・・3mg 1歳未満・・・6mg 1歳・・・8mg 2歳・・・10mg 3歳以上・・・12mg	髄注 day 1, 8			
		(研)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース4A2	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	3ヶ月未満・・・6mg 1歳未満・・・15mg 1歳・・・20mg 2歳・・・25mg 3歳以上・・・30mg	髄注 day 1, 8	21日	小児成熟B細胞性腫瘍	済
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満・・・10mg 1歳未満・・・10mg 1歳・・・15mg 2歳・・・20mg 3歳以上・・・25mg	髄注 day 1, 8			
			デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 (デキサート注)	10mg/m ² (8.25mg/m ²)	経口投与 day 1-8 (経口不可の場合点滴静注 day1-8)			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/m ²	点滴静注 day 1			
			ピンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 2			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1000mg/m ²	点滴静注 day 4, 5			
(研)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース4A2	ピラルビン(THP)	テラルビシン注射用	30mg/m ²	点滴静注 day 4, 5	21日	小児成熟B細胞性腫瘍	済		
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3ヶ月未満・・・3mg 1歳未満・・・6mg 1歳・・・8mg 2歳・・・10mg 3歳以上・・・12mg	髄注 day 1, 8					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	3ヶ月未満・・・6mg 1歳未満・・・15mg 1歳・・・20mg 2歳・・・25mg 3歳以上・・・30mg	髄注 day 1, 8					
	ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満・・・10mg 1歳未満・・・10mg 1歳・・・15mg 2歳・・・20mg 3歳以上・・・25mg	髄注 day 1, 8					
	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 (デキサート注)	10mg/m ² (8.25mg/m ²)	経口投与 day 1-8 (経口不可の場合点滴静注 day1-8)					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	5000mg/m ²	点滴静注 day 1					

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13256	2013.12.3	(研)[B-NHL03]小児B細胞性腫瘍コース4B	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 (デキサート注)	10mg/m ² (8.25mg/m ²)	経口投与 day 1-8 (経口不可の場合点滴静注 day1-8)	21日	小児成熟B細胞性腫瘍	済
			シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ²	点滴静注 2-4			
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	150mg/m ²	点滴静注 2-5			
			ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 1			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3ヶ月未満・・・3mg 1歳未満・・・6mg 1歳・・・8mg 2歳・・・10mg 3歳以上・・・12mg	髄注 day 1, 8			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	3ヶ月未満・・・6mg 1歳未満・・・15mg 1歳・・・20mg 2歳・・・25mg 3歳以上・・・30mg	髄注 day 8			
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満・・・10mg 1歳未満・・・10mg 1歳・・・15mg 2歳・・・20mg 3歳以上・・・25mg	髄注 day 1, 8			
14274	2014.6.30	(研)[ALB-NHL03]後期維持層	プレドニゾン(PSL)	プレドニン錠	40mg/m ² (max 60mg)	経口投与 day 43-47	56日	小児リンパ芽球型リンパ腫	済
			ビンクリスチン(VCR)	オンコビン注射用	1.5mg/m ² (max 2mg)	静脈内注射 day 43, 50			
			L-アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	6000U/m ²	点滴静注 day 43, 50			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート メトトレキサート点滴静注液	150mg/m ²	静脈内注射 day 1, 15, 29			
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ²	経口投与 day 1-56			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg				
14275	2014.6.30	(研)[AML-12]寛解導入1A:ECM	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	150mg/m ²	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	200mg/m ²	点滴静注 day 6-12			
			ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 6-10			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg				
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10-25mg				
		(研)[AML-12]寛解導入1B:HD-ECM	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	3000mg/m ² × 2		点滴静注 day 1, 3, 5	28日	小児急性骨髄性白血病
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	150mg/m ²	点滴静注 day 2-6			
			ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 2-6			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	髄注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg				
		(研)[AML-12]寛解導入2:HECI	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	3000mg/m ² × 2	点滴静注 day 1-3	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
			イダルビシン(IDR)	イダマイシン静注用	10mg/m ²	点滴静注 day 1			
メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート		3-12mg	髄注 day 1					
シタラビン(Ara-C)	キロサイド注		6-30mg						
(研)[AML-12]CBF SR群強化療法1:sECM	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	150mg/m ²	点滴静注 day 1-3	28日	小児急性骨髄性白血病	済		
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	200mg/m ²	点滴静注 day 4-8					
	ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 4-6					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg						
	ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10-25mg						
(研)[AML-12]CBF SR群強化療法2:HCE	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² × 2		点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済	
	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg						
(研)[AML-12]CBF SR群強化療法3:HGI	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	3000mg/m ² × 2	点滴静注 day 1-3	28日	小児急性骨髄性白血病	済		
	イダルビシン(IDR)	イダマイシン静注用	10mg/m ²	点滴静注 day 1					
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	髄注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg						
	ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10-25mg						
(研)[AML-12]CBF SR群強化療法4:HC	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² × 2		点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済	

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
14275	2014.6.30	(研)[AML-12]Non-CBF SR群・HR群強化療法1:HCM	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² × 2	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済
			ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 1-3			
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	- 随注 day 1			
			シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg				
			ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10-25mg				
	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	3000mg/m ² × 2	点滴静注 day 1-3					
	(研)[AML-12]Non-CBF SR群・HR群強化療法2:HCEI	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5	28日	小児急性骨髄性白血病	済	
		イダルビシン(IDR)	イダマイシン静注用	10mg/m ²	点滴静注 day 1				
		メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	- 随注 day 1				
		シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg					
		ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10-25mg					
	シタラビン(Ara-C)	シタラビン点滴静注液	2000mg/m ² × 2	点滴静注 day 1-5					
(研)[AML-12]Non-CBF SR群・HR群強化療法3:HCM	ミトキサントロン(MIT)	ノバントロン注	5mg/m ²	点滴静注 day 1-3	28日	小児急性骨髄性白血病	済		
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	3-12mg	- 随注 day 1					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	6-30mg						
	ヒドロコルチゾン(HDC)	ソル・コーテフ注射用	10-25mg						
	17361	2017.6.6	(研)[ALB-NHL-14]先行治療相					ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン またはブレドニン錠
メトトレキサート(MTX)				注射用メトトレキサート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	随注 day 1			
(研)[ALB-NHL-14]寛解導入相		ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン またはブレドニン錠	60 mg/m ² (最大80 mg)	経口分3投与又は静注 day 1-30(day 22-30で3段階漸減中止)	30日	リンパ芽球性リンパ腫	済	
		ビンクリスチン硫酸塩(VCR)	オンコビン注射用	1.5 mg/m ² (最大2 mg)	静注 day 1, 8, 15, 22				
		ダウノルビシン塩酸塩(DNR)	ダウノマイシン静注用	30 mg/m ² (最大60 mg)	点滴静注 day 1, 8, 15, 22				
		アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	5,000U/m ² (上限なし)	筋注または点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26				
		メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	随注 5, 26 (CNS陽性例はday 11,20に追加投与)				
		シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg					
(研)[ALB-NHL-14]早期強化相		ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg	42日				
		シクロホスファミド(GPA)	注射用エンドキサン	1,000mg/m ² (上限なし)				点滴静注 day 1, 29	
		シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/m ² (上限なし)				点滴静注 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27	
		6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ² (上限なし)				経口分1 就寝前投与 day 1-28	
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	随注 day 10, 24					
(研)[ALB-NHL-14]再寛解導入相	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg	28日					
	ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg						
	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート点滴静注液	5.0g/m ² (上限なし)				点滴静注 day 8, 22, 36, 50 投与量の10%を最初の30分で、残りの90%を		
	ホリナートカルシウム(LV)	ロイコボリン注	15mg/m ² (上限なし)				MTX 開始42, 48, 54時間目に静注		
	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ² (上限なし)				経口分1 就寝前投与 day 1-56		
(研)[ALB-NHL-14]再寛解導入相	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	35日					
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg						
	ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg						
	デキサメタゾン(DEX)	デカドロン錠 またはデキサート注射液	10mg/m ² (最大13mg)(DEX)ン酸エステル(8.25mg/m ² (最大10.7 mg)(DEX))				経口分3 投与又は静注 day 1-21(day 22-30で3段階漸減中止)		
(研)[ALB-NHL-14]再寛解導入相	ビンクリスチン硫酸塩(VCR)	オンコビン注射用	1.5 mg/m ² (最大2 mg)	28日					
	ドキシソルビシン塩酸塩(DXR)	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	30mg/m ² (最大60 mg)				点滴静注 day 8, 15, 22, 29		
	アスパラギナーゼ(L-ASP)	ロイナーゼ注用	10,000U/m ² (上限なし)				筋注または点滴静注 day 8, 11, 15, 18		
	シクロホスファミド(GPA)	注射用エンドキサン	1,000mg/m ² (上限なし)				点滴静注 day 1		
(研)[ALB-NHL-14]後期強化相	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	75mg/m ² (上限なし)	7日					
	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	60mg/m ² (上限なし)				経口分1 就寝前投与 day 1-14		
	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg				随注 day 3, 10 (CNS陽性例はday 3のみ)		
	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg						
	ブレドニゾン(PSL)	水溶性ブレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg						
(研)[ALB-NHL-14]維持相	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20mg/m ² (上限なし)	経口分1朝 day 1					
	6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	50mg/m ² (上限なし)	経口分1 就寝前投与 day 1-7					

【神経芽腫】

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13253	2013.10.1	(研)[JNBSG][05A1]CPA+VCR+THP+ODDP寛解導入療法 神経芽腫	エンドキサン(CPA)	注射用エンドキサン	1200mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	高リスク神経芽腫(寛解導入)	済
			ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 1			
			ビラルビン(THP)	テラルビン注射用	40mg/m ²	点滴静注 day 3			
			シスプラチン(CDDP)	シスプラチン点滴静注	20mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JNBSG][05A3]CPA+VCR+THP+ODDP寛解導入療法 神経芽腫	エンドキサン(CPA)	注射用エンドキサン	1200mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	28日	高リスク神経芽腫(寛解導入)	済
			ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 1			
			ビラルビン(THP)	テラルビン注射用	40mg/m ²	点滴静注 day 3			
			シスプラチン(CDDP)	シスプラチン点滴静注	20mg/m ²	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JNBSG][09MEC]L-PAM+ETP+CBDCA 神経芽腫	メルファラン(L-PAM)	アルケラン静注用	100mg/m ²	点滴静注 day -9~-8	10日	高リスク神経芽腫(強化)	済
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	200mg/m ²	点滴静注 day -7~-4			
			カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン点滴静注液	400mg/m ²	点滴静注 day -7~-4			

【脳腫瘍】

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無	
09109	2009.10.26	ICE (IFM(900)+CDDP(20)+ETP(60)) 頭蓋内胚細胞系腫瘍	イホスファミド(IFM)	注射用イホマイド	900mg/m ²	点滴静注 day 1-5	28日	頭蓋内胚細胞系腫瘍	済	
			シスプラチン(CDDP)	シスプラチン点滴静注	20mg/m ²	点滴静注 day 1-5				
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	60mg/m ²	点滴静注 day 1-5				
10155	2011.3.11	Temozolomide(75) 悪性神経膠腫:放射線併用	テモゾロミド(TMZ)	テモダール点滴静注用	75mg/m ²	点滴静注 day 1-42	70日	悪性神経膠腫 (カプセル剤の内服困難例)	済	
				150mg/m ² (2コース目以降200mg/m ² まで増量可)	点滴静注 day 1-5	28日				
13241	2013.8.6	[RT]BEV(10)+TMZ(75) 悪性神経膠腫:初発	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	10mg/kg	点滴静注 day 1, 15, 29, 42	70日	悪性神経膠腫:初発(放射線化学療法)	済	
			テモゾロミド(TMZ)	テモダールカプセル	75mg/m ²	経口投与 day 1-42				
13242	2013.8.6	[維持]BEV(10)+TMZ(150) 悪性神経膠腫	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	10mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日	悪性神経膠腫(術後化学療法)	済	
			テモゾロミド(TMZ)	テモダールカプセル	150mg/m ² (2回目以降200mg/m ² まで増量可)	経口投与 day 1-5				
13243	2013.8.6	[3週]Bevacizumab(15) 悪性神経膠腫	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	15mg/kg	点滴静注 day 1	21日	悪性神経膠腫(術後化学療法)	済	
13244	2013.8.6	[2週]Bevacizumab(10) 悪性神経膠腫:再発	ベバシズマブ(BEV)	アバステン点滴静注用	10mg/kg	点滴静注 day 1	14日	悪性神経膠腫:再発	済	
14268	2.14.4.8	VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース1	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 0	14日	再発難治性脳腫瘍	済	
			カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン点滴静注液	550mg/m ²	点滴静注 day 0				
		VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース2	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 1	14日	再発難治性脳腫瘍	済	
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサートメトトレキサート点滴静注液	800mg/m ²	点滴静注 day 1				
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサートメトトレキサート点滴静注液	7200mg/m ²	点滴静注 day 1				
VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース3	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ²	静脈内注射 day 1	14日	再発難治性脳腫瘍	済			
	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1500mg/m ²	点滴静注 day 1						
VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース4	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン点滴静注	40mg/m ²	点滴静注 day 1-2	14日	再発難治性脳腫瘍	済			
14272	2014.6.3	L-PAM(60)+CPA(1500) 自家末梢血幹細胞移植	メルファラン(L-PAM)	アルケラン静注用	60mg/m ²	点滴静注 day 5-7	9日	再発難治性脳腫瘍	済	
			エンドキサン(CPA)	注射用エンドキサン	1500mg/m ²	点滴静注 day 1-4				
15298	2015.5.7	CBDCA(500)+ETP(100) 髄芽腫R1	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン点滴静注液	500mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	21日	髄芽腫	済	
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5				
		CPA(1500)+ETP(100) 髄芽腫R2	シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1500mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	21日			
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day 1-5				
		weekly VCR(1.5)+RT 髄芽腫	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ²	点滴静注 day 1	7日			
15323	2016.3.25	(研)[LCH-12]Ara-C+VCR+PSL(寛解導入相A)	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	100 mg/m ²	点滴静注 day 1-5, 15-19, 29-33	42日	小児ランゲルハンス細胞組織球症	未	
			ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	静脈注射 day 1, 15, 29				
			ブレドニン(PSL)	ブレドニン錠	40 mg/m ² 20 mg/m ² 10 mg/m ²	経口投与 day 1-28 経口投与 day 29-35 経口投与 day 36-42				
			(研)[LCH-12]Ara-C+VCR+PSL(早期維持相A)治療区分a	シタラビン(Ara-C)	キロサイド注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1			14日
				ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	静脈注射 day 1			
				ブレドニン(PSL)	ブレドニン錠	40 mg/m ²	経口投与 day 1-4			
		(研)[LCH-12]MTX+VCR+PSL(早期維持相A)治療区分b	メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	20 mg/m ²	静脈注射 day 1	14日			
			ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	静脈注射 day 1				
			ブレドニン(PSL)	ブレドニン錠	40 mg/m ²	経口投与 day 1-3				
		(研)[LCH-12]VBL+PSL*6-MP(後期維持相C)治療区分a	ビンブラスチン(VBL)	エクザール注	6 mg/m ²	静脈注射 day 1	14日			
			ブレドニン(PSL)	ブレドニン錠	40 mg/m ²	経口投与 day 1-5				
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	30 mg/m ²	経口投与 day 1-14				

限定	2018.2.28	(研)[LCH-12]MTX+VCR+PSL(早期維持相A)治療区分b	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート錠	20 mg/m ²	終口投与 day 1	14日			
			6-メルカプトプリン(6-MP)	ロイケリン散	30 mg/m ²	終口投与 day 1-14				
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	800 mg/m ²	点滴静注 day 1-3				
			(限)CPA(800)+VCR(1.5)+MTX(2) 髄芽腫 Week1	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²				静脈注射 day 1
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	2 mg/body	髄腔内投与 day 1-4				
			(限)MTX(5000)+VCR(1.5)+MTX(2) 髄芽腫 Week3, 5	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²				静脈注射 day 1
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	5000 mg/m ²	点滴静注 day 1				
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	2 mg/body	髄腔内投与 day 1, 2				
			(限)CBDCA(200)+ETP(150)+MTX(2) 髄芽腫 Week7	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン点滴静注液	200 mg/m ²				点滴静注 day 1-3
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注 day 1-3				
			メトトレキサート(MTX)	注射用メトトレキサート	2 mg/body	髄腔内投与 day 1-4				
			限定	2018.3.2	VDC(VCR(1.5)+DXR(37.5)+CPA(1800))/VDC-ICE 脳腫瘍	ビンクリスチン(VCR)				オンコピン注射用
ドキソルビシン(DXR)	ドキソルビシン塩酸塩注射用	37.5 mg/m ²				点滴静注 day 1 (48hr)				
シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1.8 g/m ²				点滴静注 day 1				
ICE(IFM(2000)+CBDCA(600)+ETP(100))/VDC-ICE 脳腫瘍	イホスファミド(IFM)	イホマイド注			2 g/m ²	点滴静注 day 1-3	21日			
	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン点滴静注液			600 mg/m ²	点滴静注 day 1				
	エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液			100 mg/m ²	点滴静注 day 1-3				

【骨・軟部腫瘍】

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
11176	2011.10.4	(研)VAC導入 横紋筋肉腫	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	0.025mg/kg-1.5mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57	84日	横紋筋肉腫	済
			アクチノマイシンD(ACT-D)	コスメゲン静注用	0.025mg/kg-0.045mg/kg	点滴静注 day 1, 22, 43, 64			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	36mg/kg-2.2g/m ²	点滴静注 day 1, 22, 43, 64			
		(研)VAC局所 横紋筋肉腫	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	0.025mg/kg-1.5mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57	84日	横紋筋肉腫	済
			アクチノマイシンD(ACT-D)	コスメゲン静注用	0.025mg/kg-0.045mg/kg	点滴静注 day 1, 22, 43, 64 (放射線照射中は除く)			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	36mg/kg-2.2g/m ²	点滴静注 day 1, 22, 43, 64			
		(研)VAC継続 横紋筋肉腫	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	0.025mg/kg-1.5mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 85, 92	126日	横紋筋肉腫	済
			アクチノマイシンD(ACT-D)	コスメゲン静注用	0.025mg/kg-0.045mg/kg	点滴静注 day 1, 22, 43, 64, 85, 92 (放射線照射中は除く)			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	36mg/kg-2.2g/m ²	点滴静注 day 1, 22, 43, 64, 85, 92			
11177	2011.10.4	VDC(VCR(1.5)+DXR(75)+CPA(1200))/VDC-IE 骨・軟部肉腫	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5mg/m ²	点滴静注 day1, 8	14日	骨・軟部肉腫	済
			ドキソルビシン(DXR)	ドキソルビシン塩酸塩注射用	75mg/m ²	点滴静注 day1 (48hr)			
			シクロホスファミド(CPA)	注射用エンドキサン	1.2g/m ²	点滴静注 day1			
11178	2011.10.4	IE(IFM(1800)+ETP(100))/VDC-IE 骨・軟部肉腫	イホスファミド(IFM)	注射用イホマイド	1.8g/m ²	点滴静注 day1-5	21日	骨・軟部肉腫	済
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	100mg/m ²	点滴静注 day1-5			
11179	2011.10.4	High dose MTX(10g)/MAP 骨肉腫(20歳以上) High dose MTX(12g)/MAP 骨肉腫(19歳以下)	メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート点滴静注液	10g/m ²	点滴静注 day1	7日	骨肉腫(術後補助化学療法)	済
			メトトレキサート(MTX)	メトトレキサート点滴静注液	12g/m ²	点滴静注 day1			
11180	2011.10.4	DXR(30)+CDDP(120)/MAP 骨肉腫	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン点滴静注	120mg/m ²	点滴静注 day1	21日	骨肉腫(術後補助化学療法)	済
			ドキソルビシン(DXR)	ドキソルビシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	点滴静注 day1, 2			
		DXR(30)/MAP 骨肉腫	ドキソルビシン(DXR)	ドキソルビシン塩酸塩注射用	30mg/m ²	点滴静注 day1-3	21日		
11181	2011.10.4	IFM(3000)/MAP+IFM 骨肉腫	イホスファミド(IFM)	注射用イホマイド	3000mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日	骨肉腫(術後補助化学療法)	済

【小児悪性固形腫瘍】

レジメン番号	審査日	レジメン名	抗がん剤(一般名)	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール	適応	電子カルテ登録有無
13257	2014.1.8	CPT-11(20) 小児悪性固形腫瘍	イリノテカン(CPT-11)	トボテン点滴静注	20mg/m ²	点滴静注 day 1-5, 8-12	21日	小児悪性固形腫瘍	済
14280	2014.8.8	JEB(CBDCA+ETP+BLM) 小児胚細胞腫瘍	カルボプラチン(CBDCA)	カルボプラチン点滴静注液	600mg/m ²	点滴静注 day 2	21日	小児中枢神経外胚細胞腫瘍	済
			エトポシド(ETP)	エトポシド点滴静注液	120mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 3			
			プレオマイシン(BLM)	プレオ注射用	15mg/m ²	点滴静注 day 3			
限定	2017.2.7	(限)CITA(CDDP(80)+THP(30)) 肝芽腫	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン点滴静注	80mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	肝芽腫	済
			ビラルビシン(THP)	テラルビシン注射用	30 mg/m ²	点滴静注 day 2, 3			
限定	2017.2.7	(限)low-CITA(CDDP(40)+THP(30)) 肝芽腫	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン点滴静注	40mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	肝芽腫	済
			ビラルビシン(THP)	テラルビシン注射用	30 mg/m ²	点滴静注 day 2			
限定	2017.8.15	IVADo(IFM+VCR+ACT-D+DXR) 胸膜肺芽腫	イホスファミド(IFM)	イホマイド注	3 g/m ²	点滴静注 day 1, 2, 22, 23, 43, 44	49日	胸膜肺芽腫	済
			ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43			
			アクチノマイシンD(ACT-D)	コスメゲン静注用	1.5 mg/m ²	静注 day 1, 22, 43			
			ドキソルビシン(DXR)	ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 22, 23, 43, 44			

IVA(IFM+VCR+ACT-D)胸膜肺芽腫	イホスファミド(IFM)	イホマイド注	3 g/m ²	点滴静注 day 1, 2	21日
	ビンクリスチン(VCR)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	静注 day 1, 8, 15	
	アクチノマイシンD(ACT-D)	コスメゲン静注用	1.5 mg/m ²	静注 day 1	

注1) (研)は臨床研究として保険診療内であるものであり、既に倫理委員会にて承認されたレジメン。
 なお、保険診療外で行う臨床研究については本検討部会での審議は行わない。